



TABLEAU DE SYNTHÈSE DES POINTS CLÉS (avec modifications 2017)

TRAUMATISME		
Maintien tête		
<ul style="list-style-type: none"> . Le sauveteur est en position stable . Le maintien de la tête limite ses mouvements 		
OBSTRUCTION DES VOIES AÉRIENNES PAR UN CORPS ÉTRANGER		
<i>La claque dans le dos doit être donnée:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Entre les deux omoplates • Avec le talon de la main ouverte • De façon vigoureuse 		
La compression abdominale (chez l'adulte ou l'enfant de 1 an) doit être :		
<ul style="list-style-type: none"> • Au creux de l'estomac • Sans appuyer sur les côtes • Vers l'arrière et vers le haut 		
La compression thoracique doit être :		
Chez la personne que l'on ne peut pas encercler:	chez le nourrisson doit être :	
<ul style="list-style-type: none"> • Au milieu du sternum • Sans appuyer sur les côtes • Vers l'arrière 	<ul style="list-style-type: none"> • Pratiquées au milieu de la poitrine • Profondes 	
HÉMORRAGIES EXTERNES		
La compression locale doit être :		Le Garrot :
<ul style="list-style-type: none"> • Suffisante pour arrêter le saignement • Permanente 		<ul style="list-style-type: none"> • Etre situé en amont de la plaie qui saigne • Etre serré pour arrêter le saignement
PERTE DE CONNAISSANCE		
La liberté des voies aériennes est assurée lorsque :		La mise en position latérale de sécurité doit :
<ul style="list-style-type: none"> • Le menton est élevé • La tête est maintenue dans cette position 		<ul style="list-style-type: none"> • Limiter au maximum les mouvements de la colonne vertébrale • Permettre de contrôler la respiration de la victime • Aboutir à une position stable, la plus latérale possible • Permettre l'écoulement des liquides vers l'extérieur (bouche ouverte)
ARRÊT CARDIAQUE		
Les compressions thoraciques doivent :	Les deux insufflations doivent :	La mise en œuvre du défibrillateur doit :
<ul style="list-style-type: none"> • Comprimer fortement le sternum • Avoir une fréquence comprise entre 100 et 120 par minute 	<ul style="list-style-type: none"> • Etre lentes et progressives • Cesser dès le début de soulèvement de la poitrine • Etre réalisées en 5 secondes au maximum 	<ul style="list-style-type: none"> • Etre la plus précoce possible • Interrompre le moins possible la pratique des compressions thoraciques